

Marqueurs sériques du 1^{er} trimestre

MARQUEURS	VALEURS		
PAPP-A	0.5 à 2.5 MoM	< 0.4 MoM : risque augmenté de complications obstétricales (pré-éclampsie, RCIU, prématurité)*	T21 : BASSE T18 : BASSE
βhCG	0.5 à 2.5 MoM	< 0.5 MoM : risque augmenté de complications obstétricales (pré-éclampsie, RCIU, prématurité)* Augmentation : peut être associée à une triploïdie chez le fœtus ou une insuffisance rénale maternelle	T21 : ÉLEVÉ T18 : BASSE
PIGF	0.5 à 2.5 MoM	< 0.5 MoM : risque augmenté de complications obstétricales (pré-éclampsie, RCIU, prématurité)*	T21 : BASSE T18 : BASSE
AFP	0.5 à 2.5 MoM	Augmentation : peut être associée à une anomalie du tube neural au 2 ^{ième} trimestre uniquement	T21 : BASSE T18 : BASSE
Clarté nucale	< 3 mm	> 3 mm : échographie cardiaque foetale nécessaire > 3.5 mm : évaluation en génétique recommandée	T21 : BASSE T18 : BASSE

* Résultats à corrélér avec les éléments cliniques